

085 Roncesvalles - Irati - Sierra de Abodi

Navarra (Navarra)
43°00'N 1°15'W 530–2.021 m 39.000 ha

Criterios para aves
A4i, A4iv, B1i, B1iv, B2, C2, C5, C6

Hábitats
Bosques caducifolios, bosques mixtos (60%); brezal (20%); pastizales alpinos o subalpinos (20%); pastizales intensivos, cultivos, plantaciones forestales (20%).

Usos del suelo
Agricultura y ganadería (80%), forestal (60%), caza (95%)

Amenazas
Sobrepastoreo (C), apertura de pistas forestales (B), gestión forestal intensiva (A), recreo/turismo (B), talas/cortas forestales (A), presión cinegética (B)

Descripción
Tramo montañoso y forestal, de unos 30 km de longitud (altitud máx 2.021 m, Pico de Orhi) a lo largo de la frontera de Navarra con Francia. Extensos bosques de frondosas atlánticas, con hayedos en Quinto Real y Roncesvalles (al oeste) y bosques mixtos de hayedo-abetal en Irati (al este).
Explotación forestal y ganadera (vacas, caballos y ovejas). Caza. Escasamente poblado.
La principal amenaza es la explotación forestal, de alto impacto. Recientemente, el Gobierno de Navarra ha cedido los montes del estado a las entidades locales, lo que ha supuesto un incremento notable en la explotación forestal en Quinto Real. Urge la declaración de nuevos espacios protegidos forestales.

Importancia ornitológica
La zona posee el 90% de la población ibérica de Pico Dorsiblanco así como una importante población nidificante de Pito Negro. También crían el Alimoche Común (mín 3 pp) y el Buitre Leonado (mín 5 pp), así como otras rapaces forestales y rupícolas. Cría una pareja de Quebrantahuesos, y forma parte del área de campeo de otra. Límite occidental de algunas especies pirenaicas como la Perdiz Pardilla (ssp. *hispaniensis*), Acentor Alpino y Gorrión Alpino. También es un importante enclave de paso post-nupcial, con más de 500.000 palomas de diferentes especies (torcaces y zuritas, principalmente), más de 3.000 rapaces y más de 20.000 grullas, por lo que cumple los criterios numéricos de las categorías A4iv (por grullas) y B1iv y C5 (por grullas y rapaces). Los datos de especies en paso corresponden a la media entre los años 1988 a 1995 (Mín) y al máximo de individuos censados en un año de ese periodo (Máx).

Nombre común	Nombre latino	Época	Año	Mín	Máx	Prec	Criterios
Cigüeña Negra	<i>Ciconia nigra</i>	P	1995	70	125	B	B1i, C2
Abejero Europeo	<i>Pernis apivorus</i>	P	1995	5237	11000	B	
Milano Negro	<i>Milvus migrans</i>	P	1995	1453	1500	B	
Milano Real	<i>Milvus milvus</i>	P	1995	2072	3540	B	
Quebrantahuesos	<i>Gypaetus barbatus</i>	R	1996	1	1	A	B2
Grulla Común	<i>Grus grus</i>	P	1995	9790	20100	B	A4i, B1i, C2
Pito Negro	<i>Dryocopus martius</i>	R	1994	80	100	B	C6
Pico Dorsiblanco	<i>Dendrocopos leucotos</i>	R	1995	50	60	B	C2, C6

Protección
1,2 % por figuras de protección nacionales y regionales:
- Reserva Integral (Lizarzoia, 64 ha)
- Reserva Natural (Mendilaz, 119 ha)
- Reserva Natural (Tristuibarte, 56 ha).
- Área de Protección de la Fauna Silvestre (Arrollandieta, 232 ha)
47,9 % por figuras de protección internacionales:
- Zona de Especial Protección para las Aves (Selva de Irati-Roncesvalles, 18.684 ha)

Existen varios estudios sobre la densidad de población de las especies de pícidos y el impacto de la explotación forestal sobre ellas. Se necesitan más reservas forestales para proteger sus poblaciones. Seguimiento anual de la población nidificante del Quebrantahuesos (dentro del Plan de Recuperación y del Programa LIFE). Existen planes de uso y gestión de todas las zonas protegidas.